

Systèmes linéaires

Exercice 1 (Question de cours). *Qu'est-ce qu'un système linéaire homogène, non-homogène ? Etant donné un système linéaire (S) de m équations à n inconnues (non nécessairement homogène), rappeler la définition du rang du système. Quelles valeurs le rang de (S) peut-il prendre ? Quand est-ce qu'un système linéaire est incompatible ?*

Exercice 2. *Résoudre les systèmes linéaires suivants en précisant à chaque fois la dimension de l'espace des solutions et le rang du système :*

$$(a) \begin{cases} 8x - 2y + z = 3 \\ 12x + y - 2z = 1 \\ 96x - 16y + 5z = 29, \end{cases} \quad (b) \begin{cases} 2x - 2y + z - t + u = 1 \\ x + 2y - z + t - 2u = 1 \\ 4x - 10y + 5z - 5t + 7u = 1 \\ 2x - 14y + 7z - 7t + 11u = -1, \end{cases}$$

$$(c) \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 3 \\ x_1 - 3x_2 - 6x_3 = 2 \\ 3x_1 - x_3 = 4, \end{cases} \quad (d) \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = -1 \\ x_1 - 5x_2 + x_3 = 6 \\ 3x_1 + 3x_2 + 7x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 - 4x_3 = -1. \end{cases}$$

$$(e) \begin{cases} 2x - y + 3z = 1 \\ -4x + 2y + z = 3 \\ -2x + y + 4z = 4 \\ 10x - 5y - 6z = -10 \end{cases} \quad (f) \begin{cases} x - y + z + t = 0 \\ 3x - 3y + 3z + 2t = 0 \\ x - y + z = 0 \\ 5x - 5y + 5z + 7t = 0 \end{cases}$$

Exercice 3. *Vrai ou faux ?*

1. *Si un système linéaire a plus d'inconnues que d'équations, alors il a une infinité de solutions.*
2. *Si un système linéaire a plus d'équations que d'inconnues, alors il a au plus une solution.*
3. *Si le rang d'un système linéaire est égal au nombre d'équations et strictement inférieur au nombre d'inconnues, alors le système a une infinité de solutions.*
4. *Si un système a une solution unique, alors il a autant d'équations que d'inconnues.*
5. *Si un système a une solution unique, alors son rang est égal au nombre d'inconnues*
6. *Si un système a un second membre nul et si son rang est égal au nombre d'équations, alors sa solution est unique.*
7. *Si le système linéaire (S) admet une infinité de solutions, alors le système homogène associé admet une infinité de solutions.*
8. *Un système linéaire homogène a au moins une solution.*

Exercice 4. *Résoudre le système*

$$\begin{cases} x^3 y^2 z^6 = 1 \\ x^4 y^5 z^{12} = 2 \\ x^2 y^2 z^5 = 3 \end{cases}$$

Exercice 5. *Déterminer $\lambda \in \mathbb{R}$ pour que le système suivant admette des solutions différentes de $(0, 0, 0)$, puis résoudre ce système suivant les valeurs de λ :*

$$(S) \begin{cases} 3x - 7y + \lambda z = 0 \\ x - 4y - 2z = 0 \\ 2x - (\lambda + 3)y - 2z = 0. \end{cases}$$

Exercice 6. *Résoudre en fonction de a*

$$\begin{cases} x + ay + a^2 z = 0 \\ a^2 x + y + az = 0 \\ ax + a^2 y + z = 0 \end{cases}$$

Exercice 7. Soient a, b, c et m des nombres réels. On considère le système linéaire

$$(S) \begin{cases} x - y + 2z = a \\ mx + (1 - m)y + 2(m - 1)z = b \\ 2x + my - (3m + 1)z = c. \end{cases}$$

Déterminer suivant les valeurs de a, b, c, m l'ensemble des solutions de (S) .

Exercice 8. Résoudre le système linéaire

$$\begin{cases} x + my + 2z = m \\ -2x + y + (m - 2)z = 1 \\ mx + y + 2z = 2m - 1 \end{cases}$$

Exercice 9. Soient λ et μ des paramètres réels. On considère le système

$$(S) \begin{cases} x - 2y - 3z - t & = -\lambda \\ x - y - 2z & = 1 - \lambda \\ 2x - 4y - 5z & = -2\lambda \\ x - (\lambda + 2)y - (\lambda + 2)z & = -3\lambda - \mu \\ x - 3z - 3t & = \lambda^2. \end{cases}$$

1) Discuter suivant les valeurs de λ et μ l'existence ou non de solutions de (S) .

2) Résoudre (S) lorsque $\lambda = -2$ puis lorsque $\lambda = -\mu = 1$ (note : pour éviter les erreurs de calculs, vérifiez que les solutions que vous trouvez en sont bien).

Exercice 10. Discuter et résoudre le système (distinguer 3 cas $m = 1$, $m = -3$, $m \notin \{1, -3\}$) :

$$\begin{cases} mx + y + z + t = a \\ x + my + z + t = b \\ x + y + mz + t = c \\ x + y + z + mt = d. \end{cases}$$

Exercice 11. Cet exercice est pour aller plus loin (il est plus difficile que les autres). Soit $n \geq 3$. On s'intéresse à la questions suivante : existe-t-il un polygone à n côtés dont les milieux des côtés sont fixés ?

1) On considère n points dans le plan complexe d'affixes a_1, \dots, a_n . On appelle z_1, \dots, z_n les affixes des n sommets du polygone. Mettre en équation le problème. En déduire un système linéaire à résoudre.

2) Sur ce système, effectuer l'opération $L_1 - L_2 + L_3 - L_4 + \dots$. En déduire une condition sur les affixes a_1, \dots, a_n pour que le problème ait une solution.