

2-ième feuille d'exercices - Anneaux

Exercice 1 : Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau et $a, b \in A$; on pose $ab - ba = \alpha$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on a

$$a^n b - b a^n = a^{n-1} \alpha + a^{n-2} \alpha a + \dots + \alpha a^{n-1} = \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} \alpha a^k.$$

Exercice 2 : On note \mathbb{D} l'ensemble des nombres décimaux :

$$\mathbb{D} = \left\{ \frac{n}{10^k}; n \in \mathbb{Z}, k \in \mathbb{N} \right\}.$$

- Montrer que \mathbb{D} est un sous-anneau de $(\mathbb{Q}, +, \times)$.
- Quelles sont les unités de l'anneau $(\mathbb{D}, +, \times)$?

Exercice 3 : On considère le sous-ensemble suivant de \mathbb{R} :

$$\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2}; a, b \in \mathbb{Z}\}.$$

- Montrer que $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ est un sous-anneau de $(\mathbb{R}, +, \times)$.
- Justifier que pour $x \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$, il existe une unique couple d'entiers (a, b) tel que $x = a + b\sqrt{2}$. On définit $N(x)$ par

$$N(x) = a^2 - 2b^2.$$

- Montrer que pour tous $x, y \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$, $N(xy) = N(x)N(y)$. En déduire que $a + b\sqrt{2}$ (avec $a, b \in \mathbb{Z}$) est une unité de $(\mathbb{Z}[\sqrt{2}], +, \times)$ si et seulement si $a^2 - 2b^2 = \pm 1$.

Exercice 4 : Soit $(A, +, \times)$ un anneau.

- a) Soit $x, y \in A$ tels que $xy = yx$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$y^n - x^n = (y - x) \sum_{k=0}^{n-1} (x^k y^{n-1-k})$$

- En déduire que pour tout $x \in A$,

$$1 - x^n = (1 - x) \sum_{k=0}^{n-1} x^k.$$

2. On dit qu'un élément x de A est nilpotent s'il existe un entier naturel n non nul tel que $x^n = 0$. On pose $\mathcal{N}(A) = \{x \in A \mid x \text{ nilpotent}\}$.

- Montrer que si x est nilpotent alors $1 - x$ est inversible pour la loi multiplicative de A .
- Soit $x, y \in A$ tels que xy est nilpotent. Vérifier que yx est nilpotent.
- Que dire de $\mathcal{N}(A)$ lorsque A est un anneau intègre ?

3. On suppose de plus que l'anneau $(A, +, \times)$ est commutatif.

- Montrer que $\mathcal{N}(A)$ est un idéal de A .
- Montrer que dans l'anneau quotient $A/\mathcal{N}(A)$, l'élément $0 \in A/\mathcal{N}(A)$ est le seul élément nilpotent.

4. Dans cette question $A = \mathbb{Z}/72\mathbb{Z}$. Montrer que $\bar{6} \in \mathcal{N}(A)$ puis que $\mathcal{N}(A) = \{\lambda \bar{6} \mid \lambda \in \mathbb{Z}\}$. Combien $\mathcal{N}(A)$ contient-il d'éléments ?

Exercice 5 : Soit $(A, +, \times)$ un anneau commutatif et I, J deux idéaux de A . On définit le radical de I par :

$$\sqrt{I} = \{x \in A; \exists n \in \mathbb{N}^*, x^n \in I\}.$$

- (1) Montrer que \sqrt{I} est un idéal contenant I .
- (2) Si $A = \mathbb{Z}$, $I = 2\mathbb{Z}, 8\mathbb{Z}, 18\mathbb{Z}$, que vaut \sqrt{I} ? Plus généralement, si p_1, \dots, p_n sont des nombres premiers distincts, chercher $\sqrt{(p_1^{\alpha_1} \dots p_n^{\alpha_n})\mathbb{Z}}$.
- (3) Montrer que $\sqrt{\sqrt{I}} = \sqrt{I}$. En déduire que dans l'anneau quotient A/\sqrt{I} , l'élément $0 \in A/\sqrt{I}$ est le seul élément nilpotent.
- (4) Montrer que $\sqrt{IJ} = \sqrt{I \cap J} = \sqrt{I} \cap \sqrt{J}$.

Exercice 6 : Soit A l'ensemble des applications $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continues. On note $+$ et \times les opérations usuelles d'addition et multiplication des fonctions réelles.

- (1) Montrer que $(A, +, \times)$ est un anneau commutatif. Est-il intègre?
- (2) Quels sont les éléments inversibles de A ?
- (3) Pour tout élément f de A on note $Z(f) \stackrel{\text{déf.}}{=} \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) = 0\}$ l'ensemble des zéros de f . Montrer que pour tous $f, g \in A$, on a

$$f \text{ divise } g \text{ dans } A \implies Z(f) \subset Z(g).$$

A-t-on l'implication réciproque?

- (4) Soit B un sous-ensemble fermé de \mathbb{R} . Montrer que l'ensemble :

$$I(B) \stackrel{\text{déf.}}{=} \{f \in A \mid \forall x \in B, f(x) = 0\}$$

est un idéal de A .

- (5) On suppose que B est non vide et différent de \mathbb{R} . Montrer que $I(B)$ n'est pas principal (on pourra considérer la racine cubique d'un élément).

Exercice 7 : Montrer que tout anneau intègre fini $(A, +, \times)$ est un corps.

Indication : montrer d'abord que pour tout $a \in A \setminus \{0\}$, les applications $g_a : x \mapsto ax$ et $d_a : x \mapsto xa$ sont des permutations de A .

Exercice 8 : Dans $(\mathbb{R}[X], +, \times)$, on note I l'idéal engendré par $X^2 + 1$.

- a) On considère l'application $F : P \mapsto P(i)$, de $\mathbb{R}[X]$ dans \mathbb{C} . Justifier que F est un morphisme surjectif d'anneaux.
- b) Montrer que $\ker F = I$.
- c) En déduire que les anneaux $(\mathbb{R}[X]/I, +, \times)$ et $(\mathbb{C}, +, \times)$ sont isomorphes, et que $(\mathbb{R}[X]/I, +, \times)$ est un corps.

Exercice 9 : 1. a) Déterminer le sous-anneau A de $(\mathbb{C}, +, \times)$ engendré par i .

b) Quelles sont les unités de l'anneau $(A, +, \times)$?

2. Déterminer le sous-corps de $(\mathbb{C}, +, \times)$ engendré par i .